

浙江东部凤仙花属一新种

金孝锋 丁炳扬

(浙江大学生命科学院 杭州 310012)

A new species of *Impatiens* from eastern Zhejiang, China

JIN Xiao-Feng DING Bing-Yang

(College of Life Science, Zhejiang University, Hangzhou 310012)

Key words *Impatiens* L.; *I. huangyanensis* X. F. Jin et B. Y. Ding; New species; Zhejiang; China

关键词 凤仙花属; 黄岩凤仙花; 新种; 浙江; 中国

黄岩凤仙花 新种 图 1

Impatiens huangyanensis X. F. Jin et B. Y. Ding, sp. nov. Fig. 1

Species *I. jinggangensi* Y. L. Chen proxima, a qua pedunculis 1 ~ 2-floris, foliis brevioribus, c. 10 mm longis, alis stipitatis, stipitibus 3 ~ 4 mm longis, labello saccato usque ad 2.5 cm longo, purpureo-striato, basi in calcar c. 20 mm longum incurvum constricto differt.

Herba annua, 20 ~ 40 cm alta, glaberrima. Caulis succulentus, erectus vel basi adscendens, simplex vel interdum ramosus, nodis inferioribus incrassatis, radicibus fibrosis numerosis. Folia alterna, chartacea, ovato-elliptica, 2 ~ 6 cm longa, 1.5 ~ 4 cm lata, apice acuminata, basi cuneata, in petiolum 1 ~ 3 cm longum attenuata, margine crenato-serrata, serraturis mucronulatis, utrinque glabra, nervis lateralibus 6 ~ 8-jugis arcuatis. Pedunculi in axillis foliorum solitarii, c. 10 mm longi, 1 ~ 2-flori; pedicelli 1 ~ 2 cm longi, basi bracteati; bractee 3 ~ 4 mm longae, membranaceae, lineari-lanceolatae, persistentes. Flores roseo-purpurei, 3 ~ 3.3 cm longi, 1.6 ~ 1.9 cm expansi. Sepala 2, ovata, 5 ~ 6 mm longa, 4 ~ 5 mm lata, apice acuta. Vexillum suborbiculare c. 1.3 cm diam., apice emarginatum, costa dorsali medio cristata. Alae 2.2 cm longae, breviter stipitatae, stipitibus 3 ~ 4 mm longis, lobis basalibus parvis, obovatis, c. 8 mm longis, distalibus dolabiformibus, 17 ~ 20 mm longis, 6 ~ 9 mm latis, auriculis dorsalibus parvis, citrinis, inflexis. Labelum saccatum, purpureo-striatum, usque ad 2.5 cm longum, basi citrinum, in calcar c. 20 mm longum incurvum constrictum, ore horizontali, 1.4 ~ 1.5 cm lato, antice obtuso. Stamina 5, filamentis linearibus, antheris ovoideis, apice obtusis. Ovarium fusiforme, c. 5 mm longum. Capsulae lineari-cylindricae, c. 3 cm longae, apice rostratae. Semina fusca, ovoideo-globosa, c. 2 mm longa, 1.5 mm lata, brunnea, minute tuberculata, Fl. et Fr. Jul. - Aug.

China. Zhejiang (浙江): Huangyan (黄岩), Shabu (沙埠), moist places in forests, alt. 330 m, 2000-08-02, X. F. Jin (金孝锋) 6929 (holotype, here designated, HZU); the same locality, alt. 300 m, 2000-08-02, X. F. Jin 6928 (PE).

一年生草本, 高 20 ~ 40 cm, 全株无毛。茎肉质, 直立或基部斜升, 不分枝或有时分枝,




图1 黄岩凤仙花 1. 植株; 2. 侧生萼片; 3. 旗瓣; 4. 翼瓣; 5. 唇瓣; 6. 花丝及花药; 7. 子房。(金孝锋 绘)

Fig. 1 *Impatiens huangyanensis* X. F. Jin et B. Y. Ding (from X. F. Jin 6929) 1. Plant; 2. Lateral sepal; 3. Standard; 4. Wing; 5. Lip; 6. Filaments and anthers; 7. Ovary. (Drawn by Jin Xiao Feng)

下部节膨大,具纤维状根。叶互生,纸质,卵状椭圆形,长2~6 cm,宽1.5~4 cm,先端渐尖,基部楔形,并下延成1~3 cm的柄,边缘有圆齿状锯齿,齿端具小尖,两面无毛,侧脉6~8对,弧状弯曲。总花梗生于叶腋,长约10 mm,具1~2朵花;花梗长1~2 cm,基部有苞片;苞片膜质,线状披针形,长3~4 mm,宿存;花粉紫色,长3.0~3.3 cm,宽1.6~1.9 cm;萼片2,卵形,长5~6 mm,宽4~5 mm,先端急尖;旗瓣近圆形,直径约1.3 cm,先端微凹,背面中肋有鸡冠状突起;翼瓣长2.2 cm,具短柄,柄长3~4 mm,基部裂片小,倒卵形,长约8 mm,上部裂片斧形,长17~20 mm,宽6~9 mm,外缘有内折的黄色小耳;唇瓣囊状,有紫红色细条纹,长2.5 cm,基部黄色,急狭成约20 mm内弯的距;口部平展,长1.4~1.5 cm,先端钝;雄蕊5,花丝线形,花药卵形,先端钝。子房纺锤形,长约5 mm。蒴果线状圆柱形,长约3 cm,具喙尖。种子多数,卵球形,长约2 mm,宽约1.5 mm,褐色,表面粗糙。花期、果期7~8月。

本种与井冈凤仙花 *I. jinggangensis* Y. L. Chen 近似,但总花梗具1~2朵花,短于叶,约10 mm长;翼瓣具柄,柄长3~4 mm;唇瓣囊状,长2.5 cm,具紫红色细条纹,基部急狭成长20 mm内弯的距而容易区别。

致谢 承蒙中国科学院植物研究所陈艺林先生审阅标本并对文稿提出宝贵修改意见,谨此深表谢意!

(责任编辑 徐黎)